

# 0808 抗氧化維生素分析採檢須知

## Antioxidant Vitamin Analysis

### 請注意！

- 正確採集檢體是進行檢驗必備條件，採檢前請先仔細閱讀此份採檢須知。
- 請確認採檢管是否於**有效期限**內，及客戶基本資料標籤貼紙應避免遮蓋有效期限。
- 請於“採檢管”與“功能醫學檢測申請單”上填妥相關基本資料(如受檢者姓名、性別、採檢日期及出生年月日等)。您的配合將有助於檢測結果的判讀。

### 檢體

紫頭 3ml x 1 支(血漿)，冷藏  
綠頭 3ml x 1 支(血漿)，冷藏  
紅頭 8ml x 1 支(血清)，冷藏

### 採檢注意事項

1. 空腹 8 小時以上抽血，可喝開水但勿超過 250ml。
2. 血液檢體置於 4°C 冷藏保存。

### 血液採檢法

1. 請於檢驗申請單上填妥姓名、性別、採檢日期、及出生年月日。採血管上填妥姓名及採檢日期。
2. 抽取血液檢體 1 支 EDTA 採血管(紫頭)與 1 支 Heparin 採血管(綠頭)，1 支生化採血管(紅頭)。
3. 1 支 EDTA 採血管(紫頭)與 1 支 Heparin 採血管(綠頭)檢體採集後，輕輕上下翻轉 10 次，待血液與抗凝劑混合均勻後 4°C 冷藏保存。
4. 檢體儘速送回實驗室。

### 報告天數

7 天